

Test subtelomerowy metodą MLPA

MLPA (*Multiplex Ligation-dependent Probe Amplification*) jest to zależna od ligacji multipleksowa amplifikacja sond. Wykorzystuje specyficzną mieszaninę sond, która umożliwia równoczesną identyfikację zmian liczby kopii sekwencji DNA w regionach subtelomerowych chromosomów (zestawy SALSA MLPA kit P036/P070).

Do wykonania badania w Pracowni Cytogenetyki i Hodowli Tkanek niezbędne jest poprawne wypełnienie Karty Zlecenia Badania Cytogenetycznego oraz dołączenie Deklaracji Świadomej Zgody Pacjenta na Badanie Genetyczne. Analiza wybranych zespołów mikrodelecyjnych/locus metodą MLPA może trwać do 8 tygodni.

Dodatkowe informacje pod numerem: 22 815 74 56

Materiał:

- krew obwodowa pobrana na EDTA + zlecenie na izolację DNA do Pracowni Genetyki Molekularnej
- wyizolowane DNA

Czas oczekiwania: do 12 tygodni

Badania techniką MLPA nie wymagają od pacjenta specjalnego przygotowania. Do pobrania krwi pacjent **nie musi być na czczo**. Zaleca się dobre nawodnienie małych dzieci przed pobraniem krwi.