



Szczegółowe zasady pobierania materiału biologicznego do badań wykonywanych w Pracowni Terapii Monitorowanej, Farmakokinetyki Klinicznej i Toksykologii

Nazwa badania	Minimalna ilość i rodzaj materiału badanego	Uwagi dotyczące pobierania i transportu materiału do badania
6-Thioguanina (metabolit Azatiopryny)*	1,2 ml pełnej krwi	Krew pobrana na K ₃ -EDTA *wymagane podanie liczby krwinek czerwonych (morfologia)
AFP	0,2 ml surowicy	Krew pobrana „na skrzep”
Amikacyna	0,2 ml surowicy	60 minut po zakończeniu 1-godzinnego wlewu Krew pobrana „na skrzep”
Anty-TG	0,2 ml surowicy	Krew pobrana „na skrzep”
Anty-TPO	0,2 ml surowicy	Krew pobrana „na skrzep”
Cyklosporyna	1,2 ml pełnej krwi	Przed kolejną dawką leku o ile lekarz nie zaleci inaczej Krew pobrana na K ₃ -EDTA
DHEA's	0,2 ml surowicy	Krew pobrana „na skrzep”
Diazepam	0,5 ml surowicy	Przed kolejną dawką leku o ile lekarz nie zaleci inaczej Krew pobrana „na skrzep”
Digoksyna	0,2 ml surowicy	Przed kolejną dawką leku o ile lekarz nie zaleci inaczej Krew pobrana „na skrzep”
Estradiol	0,2 ml surowicy	Krew pobrana „na skrzep”
Etosuksymid	0,2 ml surowicy lub osocza	Przed kolejną dawką leku o ile lekarz nie zaleci inaczej Krew pobrana „na skrzep” lub na EDTA
Fenobarbital	0,2 ml surowicy lub osocza	Przed kolejną dawką leku o ile lekarz nie zaleci inaczej Krew pobrana „na skrzep” lub na EDTA
Fenytoina	0,2 ml surowicy lub osocza	Przed kolejną dawką leku o ile lekarz nie zaleci inaczej Krew pobrana „na skrzep” lub na EDTA
Ferrytyna	0,2 ml surowicy	Krew pobrana „na skrzep”
FSH	0,2 ml surowicy	Krew pobrana „na skrzep”
FT3	0,2 ml surowicy	Krew pobrana „na skrzep”
FT4	0,2 ml surowicy	Krew pobrana „na skrzep”
Gancyklowir	0,5 ml surowicy	Przed kolejną dawką leku o ile lekarz nie zaleci inaczej Krew pobrana „na skrzep”
Gentamycyna	0,2 ml surowicy	Przed kolejną dawką leku o ile lekarz nie zaleci inaczej Krew pobrana „na skrzep”
Karbamazepina metodą HPLC	0,2 ml surowicy lub osocza	Przed kolejną dawką leku o ile lekarz nie zaleci inaczej Krew pobrana „na skrzep” lub na EDTA
Klonazepam	0,5 ml surowicy	Przed kolejną dawką leku o ile lekarz nie zaleci inaczej Krew pobrana „na skrzep”
Kortyzol	0,2 ml surowicy	Krew pobrana „na skrzep”



Kwas mykofenolowy (Cell-Cept)	0,5 ml surowicy	Przed kolejną dawką leku o ile lekarz nie zaleci inaczej Krew pobrana „na skrzep”
Kwas walproinowy	0,2 ml surowicy lub osocza	Przed kolejną dawką leku o ile lekarz nie zaleci inaczej Krew pobrana „na skrzep” lub na EDTA
Lamotrygina	0,2 ml surowicy lub osocza	Przed kolejną dawką leku o ile lekarz nie zaleci inaczej Krew pobrana „na skrzep” lub na EDTA
Lewetiracetam (Keppra)	0,2 ml surowicy lub osocza	Przed kolejną dawką leku o ile lekarz nie zaleci inaczej Krew pobrana „na skrzep” lub na EDTA
LH	0,2 ml surowicy	Krew pobrana „na skrzep”
Makroprolaktyna	0,2 ml surowicy	Krew pobrana „na skrzep”
Meksyletyna	0,5 ml surowicy	Przed kolejną dawką leku o ile lekarz nie zaleci inaczej Krew pobrana „na skrzep”
Metotreksat	0,2 ml surowicy	Krew pobrana „na skrzep”
Mitotan	0,5 ml surowicy	Przed kolejną dawką leku o ile lekarz nie zaleci inaczej Krew pobrana „na skrzep”
Nitrazepam	0,5 ml surowicy	Przed kolejną dawką leku o ile lekarz nie zaleci inaczej Krew pobrana „na skrzep”
Okskarbazepina (aktywny metabolit)	0,2 ml surowicy lub osocza	Przed kolejną dawką leku o ile lekarz nie zaleci inaczej Krew pobrana „na skrzep” lub na EDTA
Parathormon	0,2 ml surowicy	Krew pobrana „na skrzep”
Pirymethamina	0,5 ml surowicy	Przed kolejną dawką leku o ile lekarz nie zaleci inaczej Krew pobrana „na skrzep”
Progesteron	0,2 ml surowicy	Krew pobrana „na skrzep”
Prolaktyna	0,2 ml surowicy	Krew pobrana „na skrzep”
Propafenon	0,5 ml surowicy	Przed kolejną dawką leku o ile lekarz nie zaleci inaczej Krew pobrana „na skrzep”
Prymidon	0,2 ml surowicy lub osocza	Przed kolejną dawką leku o ile lekarz nie zaleci inaczej Krew pobrana „na skrzep” lub na EDTA
SHBG	0,2 ml surowicy	Krew pobrana „na skrzep”
Sirolimus	1,2 ml pełnej krwi	Przed kolejną dawką leku o ile lekarz nie zaleci inaczej Krew pobrana na K ₃ -EDTA
Sultiam	0,2 ml surowicy lub osocza	Przed kolejną dawką leku o ile lekarz nie zaleci inaczej Krew pobrana „na skrzep” lub na EDTA
Takrolimus	1,2 ml pełnej krwi	Przed kolejną dawką leku o ile lekarz nie zaleci inaczej Krew pobrana na K ₃ -EDTA
Testosteron	0,2 ml surowicy	Krew pobrana „na skrzep”
Thiopental	0,2 ml surowicy	Krew pobrana „na skrzep”



TSH	0,2 ml surowicy	Krew pobrana „na skrzep”
Wankomycyna	0,2 ml surowicy	Przed kolejną dawką leku o ile lekarz nie zaleci inaczej Krew pobrana „na skrzep”
Zonisamid	0,2 ml surowicy lub osocza	Przed kolejną dawką leku o ile lekarz nie zaleci inaczej Krew pobrana „na skrzep” lub na EDTA