

**Klinika Urologii Dziecięcej IPCZD**  
**PRACOWNIA BADAŃ URODYNAMICZNYCH**  
**Telefony: sekretariat (22) 8151358 i pielęgniarki (22) 8157772**

**Termin badania:**

Dziecko zgłasza się do **sekretariatu Pracowni** w wyznaczonym terminie w godzinach rannych od 08:30. W przypadku choroby, zakażenia lub innego zdarzenia losowego (np. **miesiączka u dziewcząt**) prosimy o zmianę terminu badania w **sekretariacie!**

**Pacjent powinien posiadać:**

- **Aktualne badania moczu ogólnego i posiewu**, które należy wykonać na tydzień przed terminem badania  
W przypadku złych badań moczu należy skontaktować się z sekretariatem **Pracowni w celu zmiany terminu badania**

**UWAGA: Przy braku badań moczu badanie urodynamiczne nie zostanie wykonane**

- Zdjęcia rentgenowskie pęcherza (cystografia mikcyjna), wynik badania USG lub izotopowego nerek, jeśli takie badania były wykonywane poza IPCZD
- Karty informacyjne leczenia szpitalnego, wyniki poprzednich badań urodynamicznych (spoza IPCZD)
- Wypełniony tak zwany „dzienniczek mikcji” (jeśli był zlecony)

**PRZYGOTOWANIE DO BADANIA URODYNAMICZNEGO**

- włączenie leczenia przeciwbakteryjnego (Furagin) w pełnej dawce (lekarz rodzinny) dzień przed badaniem!
- wykonanie lewatywy w dniu poprzedzającym badanie po godzinie 18:00 - gotowy preparat do nabycia w aptece (enema, rectanal).  
Dzieciom do 1 roku życia można podać doodbytniczo czopek glicerynowy, ale przy zaparciach również należy wykonać lewatywę.  
**W dniu badania należy wykonać toaletę całego ciała!**
- **W dniu badania dziecko może jeść!**  
**BEZ LEWATYWY - BADANIE NIE BĘDZIE WYKONANE!!!**

**UWAGA: Dzieci z pęcherzem i jelitem neurogennym wymagają wykonywania lewatyw przez 3 kolejne dni przed badaniem**

- nie podajemy dziecku dużych ilości płynów bezpośrednio przed badaniem, ilości dopuszczalne to 125-200 ml dla małego dziecka i 250-300 ml dla większego, podane na godzinę przed badaniem
- nie wymuszamy na dziecku oddania moczu, dziecko powinno samo spontanicznie zgłosić chęć oddania moczu
- **dzieci powinny w domu oddać mocz po nocy!**
- małe dzieci nie kontrolujące samodzielnego oddawania moczu powinny być zaopatrzone w zapas pampersów

**UWAGA: Dzieci zakażone antygenem HBs lub HCV prosimy o zgłaszanie się do Pracowni o godzinie 13-stej**

**UCZULENIE NA LATEKS U DZIECKA ,PROSZĘ ZGŁASZAĆ PRZED BADANIEM LUB PRZY UMAWIANIU TERMINU BADANIA!!!**